

Hamilelik Ginitisi (Pregnancy Gingivits)

Hamileliğin erken safhalarında diş etlerinde şişlikler ve kızarıklıklar gözlemlenebilir.

Diş eti oldukça hassas ve çabuk kanar. Hamilelik sırasında kadınların diş etlerinde oluşan bu değişikliklerin nedeni, hormonlarının değişmesinden kaynaklanmaktadır. Hamilelik gingivitisi dediğimiz diş hastalığı genellikle hamileliğin 2. ayında başlayıp , 8. ayında en üst seviyeye çıkar. Doğumdan sonra kendiliğinden iyileşir.



Geçmiş Olsun Dileklerimizle..



**HASTANEMİZDE RANDEVULU
HİZMET VERİLMEKTEDİR
RANDEVULARINIZI **182** NOLU
TELEFONDAN ve WEB
SİTEMİZDEN ALABİLİRSİNİZ**

**SAĞLIKLI DİŞLER
MUTLU GÜLÜŞLER DİLİYORUZ**



T.C

KOCAELİ VALİLİĞİ

Sağlık İl Müdürlüğü

Nuh Çimento Sanayi Vakfı

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



**HAMİLELERDE AĞIZ VE DİŞ
SAĞLIĞI BİLGİLENDİRME
BROŞÜRÜ**

**Hastanemizde randevulu sistem ile hizmet
verilmektedir.**

Randevu Telefon: 182

**WEB sitemizden de randevu
alabilirsiniz.**

www.nuhcimentoadsm.saglik.gov.tr/

Adres :Emek Evler Mah Sapanca Yolu Cad No 3

Telefon : 0 262 371 51 70

FAX : 0 262 371 19 57

HAMİLELİK DÖNEMİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI



“Hamilelik sırasında bebeğin kendisi için gerekli olan kalsiyumu annenin dişlerinden alarak annesinin dişlerinin çabuk çürümesine yol açtığı ,bu nedenle hamile annelerin diş kaybına uğradığı” düşüncesi tamamen yanlıştır.

Hamilelik sırasında annenin dişlerinden kalsiyum kaybı olduğuna dair herhangi bir bilimsel kayıt yoktur.Bu dönemde bebeğin ve annenin kemiklerinin sağlıklı olabilmesi için annenin günlük , 1200 -1500 mg kalsiyuma gereksinimi vardır.

Hamilelik sırasında kadın süt ve süt ürünleri , yeşil yapraklı sebzeler gibi kalsiyumdan zengin gıdalar alarak kalsiyum gereksinimini karşılamalıdır.

Eğer gıdalarla yeterli kalsiyum sağlanmazsa bebeğin gelişimi için gerekli olan miktar annenin kemiklerinden karşılanır.Eğer iyi bir beslenme ile yeterli bir ağız ve diş sağlığı bakımı yapılırsa hamilelik döneminde normal dönemden farklı bir diş sorunu ile karşılaşılmayacaktır.

Hamilelik sırasında beslenme hem annenin hemde bebeğin genel sağlığı ve ağız ve diş sağlığı için oldukça önemlidir.



A.C.D vitaminleri ile fosfor ve kalsiyumdan temel yiyecekler alan meyveler ve sebzeler , tahıl süt ve mandıra ürünleri ile et , balık ve yumurta dengeli olarak alınmalıdır.

Hamilelik Sırasında Diş Tedavisi Yapılabilir Mi?

Hamileliğin ilk üç ayında bebeğin organ gelişim evresi olan ilk üç ayda etkili dental tedaviden kaçınılmalıdır.Tedaviler ikinci veya üçüncü aya ertelenmelidir.

Üçüncü Aylık Dönem:

Bu dönemde bebek anne karnında oldukça büyümüştür ve doğum yaklaşmıştır.Anne koltuğa rahat oturamaz ve aşırı sitres erken doğuma neden olabilir. Aynen ilk üç aylık dönem de olduğu gibi, acil tedaviler dışında diş hekimi müdahale etmeyecektir.



Diş yada diş eti iltihabı gibi acil durumlarda, var olan enfeksiyonun bebeğin gelişimini dental tedavinin olumsuzluklarından daha fazla etkileyebileceği düşüncesi ön plana alınmalı ve bir jinekoloğun önerileri doğrultusunda dental tedavi yapılmalıdır.



Diş Röntgeni Çekilebilir mi?

İlk üç aylık dönemde bebeğin organ taslakları geliştiği için röntgen çekilmesi tavsiye edilmez Sonraki dönemlerde röntgen çekilmesinde bir sakınca yoktur.

Bu konuda kadın doğum doktorumuzla görüştükten sonra hekiminize başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer acil bir tedavi için kesinlikle röntgen filmi çekilmesi gerekiyorsa , anne adayının özel koruyucu kurşun ve önlük giydirilmeli ve düşük doz uygulanması yapılmalıdır.

Böylece ağız dokularımız dinlenecek ve ağız sağlığımız korunmuş olacaktır. Protezler gece çıkarıldığında su içine bırakılmalıdır. Bir bardak içinde ve çocukların erişemeyeceği yerde tutulmalıdır. Geceleri protezlerini çıkarmamak durumunda olan genç insanlar ise gündüz ve uygun olan bir zamanda Ağız dokularını dinlendirmelidir. Protezin ömrü 4-5 yıldır.

Protezin Bakımı

Sağlıklı bir ağız için , protezlerinizin gıda atıklarını her yemekten sonra temizlemek gerekir. Protezlerinizin her bölümünü protez temizleme fırçası ile fırçalayınız , fazla kuvvet harcamayınız. Temizleme işleminde diş macunu veya aktif temizleme tableti gibi maddeleri kullanabilirsiniz- Temizleme için kesinlikle çamaşır suyu tuz ruhu vs. gibi maddeleri kullanmayınız.

Protezinizin tamire gereksinim olduğu durumlarda diş hekiminize başvurunuz. Yılda en az bir kere diş hekiminize muayene olmalısınız. Yeni protezlerinizin başarısı diş hekiminize olduğu kadar sizede bağlıdır. Sabırlı ve olumlu yaklaşım ile rahatça protez kullanan milyonlarca insandan biri olabilirsiniz.

***Sağlıklı Dişler Mutlu Gülüşler
Dileriz....***



**HASTANEMİZDE RANDEVULU
HİZMET VERİLMEKTEDİR
RANDEVULARINIZI 182 NOLU
TELEFONDAN ve WEB
SİTEMİZDEN ALABİLİRSİNİZ**

**SAĞLIKLI DİŞLER
SAĞLIKLI GÜLÜŞLER
DİLİYORUZ**



**T.C
KOCAELİ VALİLİĞİ
Sağlık İl Müdürlüğü
Nuh Çimento Sanayi Vakfı
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi**



**DİŞ PROTEZİ KULLANIMI VE BAKIMI
BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ**
Hastanemizde randevulu sistem ile hizmet
verilmektedir.

Randevu Telefon: 182

**WEB sitemizden de randevu
alabilirsiniz.**

www.nuhcimentoadsm.saglik.gov.tr/

Adres:Emek Evler Mah Sapanca Yolu Cad No 3

Telefon : 0 262 371 51 70

FAX : 0 262 371 19 57

Protezinizin olması ağız hijyeni ve bakımına daha az dikkat edeceğiniz anlamına gelmez., doğal olmayan dişlerin daha çok bakılmasına ve temizlenmesine ihtiyacı vardır.

PROTEZ DIŞ NEDİR ? PROTEZ DIŞ NASIL YAPILIR?

Ağızda çeşitli nedenlerle estetik bozuklukların veya kaybedilmiş olan dişlerin yerine konan , dişlerin estetik ve fonksiyonel olarak ihtiyaçlarını gideren tüm yapay oluşumlar protezdir(takma diş) Genel olarak diş kayıpları diş eti hastalıkları tedavi edilmemesi sonucunda oluşabilmektedir.Bunun yanında bazı kazalar sonucundada diş kayıpları meydana gelmektedir. Bu nedenle sağlıklı dişlerle benzer görevi görecek protezler yapılmalıdır.

YENİ PROTEZ KULLANACAK HASTALARA ÖNERİLER

Tam protez , doğal dişlerin olmaması nedeniyle çiğneme fonksiyonu yitirmiş olanlara yapılır.Bütün diğer konular gibi protezinizi kullanmayı öğrenmeniz de biraz zamanınızı alacaktır.Kararlı olup konuya olumlu yaklaşırsanız bir süre sonra protezinizi rahat kullandığınızı göreceksiniz.

PROTEZ ÇEŞİTLERİ

- Sabit Protez :Hastanın çıkaramadığı kroon-köprü gibi yapıştırma protezler.
- Hareketli Protezler :Hastanın istediği zaman takıp çıkarabileceği protezlerdir.
- A. Total Protezler Tüm dişlerin eksik olduğu ağızlara uygulanır
- B. Parsiyel protezler :Kısmen dişsiz ağızlara uygulanır.Dişler üzerine gelen tırnaklar ve kancalarla tutuculuk sağlar.

BAŞLANGIÇTA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Yeni proteziniz ağızınızda yabancı ve büyük gibi olacak , dudak ve yanaklarda doluluk hissi duyulacaktır.. Alt protez daha çok hareket edecek ve yerinden çıkabilecektir. Alt proteze alışmak, üst proteze alışmaktan daha zordur ve daha uzun zaman alır . İlk günlerde tükürük miktarında artma olabilir., Bu zamanla geçecektir. (Protezlerin yumuşak dokuları oturması ve fonksiyon sonucunda hareket etmesi sonucunda yapımında ne kadar özen gösterilmiş olursa olsun bazı yerlerde vuruklar olabilir. Vurukları kesinlikle kendiniz düzeltmeyiniz , hekiminize başvurunuz.Vurukların hasta tarafından alınması yanlıştır, sorunları büyütebilirsiniz. Vurulan yerlerin alınması için diş hekimine gelmeden önce protezlerinizin en az iki gün kullanmış olmalısınız. Bu süre vuruk yerlerin görülebilmesini sağlar. Bir kaç hafta içinde ağızdaki dokular proteze uyum sağladıkça bu sorunların kendiliğinden azalacağına tanık olacaksınız. Protez takıldıktan sonra şikayet olmaması çok ender görülen bir durumdur.



YEMEK YEME VE ÇİĞNEME

Protezinizi yeni kullanmaya başladığınız günlerde **yumuşak** gıdalarla işe başlamalısınız.

Yiyecekleri küçük parçalara bölerek ve yavaşça çiğneyerek yiyiniz. Yemek yerken çenenizin her iki tarafını ve arka dişleri kullanarak çiğneyiniz. Protezi kullanmakta iyice tecrübe kazanmadan çok sert ve çiğnenmesi zor gıdaları yemeye çalışmayınız.



Hastanın protezi ilk takıldığı zamanlarda su içerken bile yerinden oynamaması mümkün değildir. Çiğneme-yi öğrenmek zaman ister.

Tam protezlerde normal olarak yemek en azından 6—8 hafta sürer. Tam protezlerde özellikle ilk haftalarda ön dişlerle kesinlikle ısırılmamalıdır. Bu protezin arka kısımların dokulardan uzaklaşmasına neden olur.

Konuşma

Biraz zaman alabilir. Yüksek sesle okuma çalışması yapılmalıdır. Doğru telaffuz edilemeyen kelimeleri tekrar edilerek normal hale getirilmeye çalışılmalıdır.

Görünüm

Protezi ilk kullanmaya başladığınız zaman yüzünüzün görünümünü size değişik gelebilir. Yanak ve dudak kaslarınız protezle uyum sağlayınca görünümünüz normale dönecektir. Aynaya bakarsanız protezle daha genç göründüğünüzü fark edeceksiniz. Yanak ve dudaklarınızdaki çökme protezinizle düzelecektir. Rahat davrandığınız ölçüde doğal görünürsünüz. Yapay (takma) dişlerin görünümü son derece güzel ve sağlıklıdır.

Protezin Kullanımı

Protezinizi gün içinde ne kadar kullanacağınızı komsusunda diş hekiminizin önerilerine uyunuz. Protezinizi kullanmaya alıştıktan sonra protezinizi geceleri çıkarın.

- Sigara içilmemeli alkol alınmamalıdır.
- Diş çekimi yarası 1—2 hafta içinde kapanır bu süre içinde ağız temizliğine normalden daha fazla özen gösterilmesi (enfeksiyonlardan korunma bilmek için) tavsiye edilir.



**SAĞLIKLI DİŞLER
MUTLU GÜLÜŞLER DİLİYORUZ**



**HASTANEMİZDE RANDEVULU
HİZMET VERİLMEKTEDİR
RANDEVULARINIZI **182** NOLU
TELEFONDAN ve WEB
SİTEMİZDEN ALABİLİRSİNİZ**

**SAĞLIKLI DİŞLER
MUTLU GÜLÜŞLER DİLİYORUZ**



**T.C
KOCAELİ VALİLİĞİ
Sağlık İl Müdürlüğü
Nuh Çimento Sanayi Vakfı
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi**



**DİŞ ÇEKİMİ VE SONRASI BİLGİLENDİRME
BROŞÜRÜ**

**Hastanemizde randevulu sistem ile hizmet
verilmektedir.**

Randevu Telefon: 182

**WEB sitemizden de randevu
alabilirsiniz.**

www.nuhcimentoadsm.saglik.gov.tr/

Adres :Emek Evler Mah Sapanca Yolu Cad No 3

Telefon : 0 262 371 51 70

FAX : 0 262 371 19 57

DIŞLER NEDEN ÇEKİLİR ?

Dişler çeşitli nedenlerden dolayı çekilebilir

- Çürüğün diş köküne ulaşması
- Enfeksiyonun dişi yada çevreleyen kemiğin büyük bir kısmını yok etmesi
- Ağızda tüm dişler için yeterli yer kalmaması

Bir çok diş hekimi , sadece kısmen çıkan gömülü dişlerin çekilmesini tavsiye etmektedir. Kısmen çıkan dişlerin çevresine bakteriler girerek , enfeksiyona neden olabilir. Ve dişi çevreleyen kemiğe yayılarak ciddi bir soruna neden olabilir. Gömülü dişler, çıkabilecekleri yeterli yer olamamasına rağmen diş eti dokusunu zorlamaya devam edebilir. Bu çıkış denemesinin yol açtığı sürekli basınç, yakındaki dişlerin köklerine hasar verebilir. Gömülü dişin çekilmesi oluşabilecek bir enfeksiyona yandaki dişte ve kemikte meydana gelebilecek hasarı ve ileride otaya çıkabilecek ağrıları önleyebilir.

DIŞ ÇEKİMİ KUVVET GEREKTİRİR Mİ ?

BU BAKIMDAN BAYAN VE ERKEK

DIŞ HEKİMLERİ ARASINDA FARK VARMIDIR ?

Çekim sırasında elbette bir kuvvet uygulanır. Ancak çekim aletleri zaten hekimin uyguladığı kuvvetleri bir kaç katına çıkaracak şekilde tasarlandığından , aşırı kuvvet olumsuz sonuçlar bile doğurabilir. Dolayısıyla diş çekimi daha ziyade teknik bilgi ve beceri gerektiren bir girişimdir. Bir çok çene cerrahının bayan olduğu unutulmamalıdır.

TEDAVİ SIRASINDA UYGULANMIŞ ANESTEZİ SONRASINDA LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KURALLARA UYUNUZ.

- Yumuşak olan bölgenin ısırılmaması sağlanmalıdır.
- Diş çekimi sonrası en az iki saat süreyle beslenme yapmayınız. Uyuşukluğunuz geçmeden açlık hissedilir ise veya kan şekeri düşerse ılık sıvı besinler veya meyve suyu tüketilmelidir. Çiğneme yapmamalıdır, sıcak gıdalar (çorba , kahve ,çay vs.) tüketilmemelidir.
- Anestezinin geçmesi sırasında karıncalanma hissedilir. Herhangi bir sorun yada korkulacak bir şey yoktur. Lokal anestezi etki süresi üst çenede ortalama iki saat alt çenede 4-6 saat olabilir.
- (Kişisel ve yapısal özelliklere ilaç tipine göre bazen 1, bazen de 4-5 saat sürebilir.)
- Anestezinin etkisinin geçmemesi nadir rastlanabilen bir durumdur. Böyle bir durumla karşılaşırsanız hastane iletişim telefonlarımızdan hekiminize başvurunuz
- Çekim yerine konan pamuk tampon , 15 dk dişler sıkılarak bastırılmalıdır. Çekim yarasının ilk andaki kanaması tamponlama ile durdurulmaktadır. İlk gün sızıntı şeklinde kanama olabilir artması halinde hekiminize başvurulmalıdır.




- Pamuk tamponun sık sık değiştirilmesi pıhtılaşmayı geciktireceğinden tavsiye edilmez.
- Lokal uyuşukluk geçtikten sonra , hafif bir ağrı olabilir. Bu durumda (aspirin dışında !) hekiminizin önerdiği ağrı kesici ilaç kullanılabilir ilk 24 saat içerisinde sıcak banyo yapılmamalı , sıcak havada güneş altında kalınmamalıdır.



**Diş Çekiminden Sonra
Sigara İçmeyiniz!!!!**

- Dişin üzerinde ipi , c harfi çizecek şekilde ileri — geri yukarı — aşağı hareket ettirerek ara yüzü temizleyebilirsiniz.



**SAĞLIKLI DİŞLER
MUTLU GÜLÜŞLER
DİLİYORUZ...**



**HASTANEMİZDE RANDEVULU
HİZMET VERİLMEKTEDİR
RANDEVULARINIZI **182** NOLU
TELEFONDAN ve WEB
SİTEMİZDEN ALABİLİRSİNİZ**

**SAĞLIKLI DİŞLER
MUTLU GÜLÜŞLER
DİLİYORUZ..**



**T.C
KOCAELİ VALİLİĞİ
Sağlık İl Müdürlüğü
Nuh Çimento Sanayi Vakfı
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi**



**AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ**

Hastanemizde randevulu sistem ile hizmet verilmektedir.

Randevu Telefon: 182

**WEB sitemizden de randevu
alabilirsiniz.**

www.nuhcimentoadsm.saglik.gov.tr/

Adres :Emek Evler Mah Sapanca Yolu Cad No 3

Telefon : 0 262 371 51 70

FAX : 0 262 371 19 57



Ağız vücudumuza giren hastalıkların giriş yollarından bir tanesidir. Bu yüzden hastalıkları engelleme , ağız ve diş sağlığının korunması konusunda düzenli bakım büyük önem taşır. Diş fırçalamayla yaptığımız bu işlem ağızdaki bakterileri sürekli olarak uzaklaştırmaktır.

Diş Fırçası Seçimi Küçükbaşlı, sık kıllı, kıl uçları yuvarlatılmış düz kesimli kıl demetleri olan fırçalar seçilmelidir.. Bu fırçalar diş hekiminiz aksini belirtmediği sürece orta sert olmalıdır. Dişler çok sert bir tabaka olan mine ile kaplı olmasına rağmen yanlış bir teknikle uygulayacağımız bir fırçadan bile büyük zarar görebilir.

BİR DİŞ FIRÇASINI NE KADAR KULLANABİLİRİM ?

Genelde 3-4 ay kullanılabilir diş fırçasının bozulduğunu kıldemetlerinin birbirinden ayrılmasından dağılmasından ve eğilmesinden anlayabilirsiniz. Sert kıllı fırçalar dişlerinize zarar verebilir.Çocuklar ise henüz doğru fırçalamayı tam olarak uygulamadıklarından daha çabuk fırça eskitirler.



EN DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA TEKNİĞİ HANGİSİDİR? Öncelikle fırça 45 derece açıyla dişle yaklaştırılmalı ve dişin eni doğrultusunda ileri geri hareketlerle fırçalanmalıdır. En son diş etinden aşağıya doğru bir süpürme hareketiyle işlem tamamlanır dişlerin iç yüzeyleri özellikle ön bölgeler dar olduğundan fırça dik olarak sokularak fırçalanmalıdır. Unutulmamalıdır ki bakteri plağının ve yiyecek artıklarının yoğun olduğu dişlerin arka yüzleri , arka dişler ve dilde temizlenmelidir.

UYGUN BİR TEKNİK KULLANILMAZSA DİŞLER ZARAR GÖREBİLİR ?

Evet , dişler çok sert bir tabaka olan mine ile kaplı olmasına rağmen yanlış bir teknikle büyük zarar görebilir. Hemen dişin üst kısmında , hemde kökü kaplayan tabakada aşınmalara diş etinde de kanamalara yol açabilir . Bu durumda dişler çürüğe daha yakın hale gelir , dişleri aşındıracak kadar büyük bir kuvvetle , diş fırçalamaktan kaçınılmalı ve yumuşak hareketlerle fırça oynatılmalıdır.



FIRÇADAN BAŞKA DİŞ TEMİZLİK ARAÇLARI VAR MIDIR ?

Bunlar , elektrikli fırça , diş ipliği , ara yüz fırçası , su püskürteci (water—pic) stimulator... gibi.Elektirikli , fırça ve su püskürteci ülkemizde giderek yaygınlaşmaktadır.



DİŞ MACUNU NASIL OLMALIDIR ?

Diş macunu , dişlerinizin gündelik ihtiyacı olan flor dozunu alması için idealdir. Diş macunu seçenekleri çoktur. .



Diş ipini kullanırken şu noktalara dikkat etmelisiniz;

- Florlu diş ipleri tercih edilebilir.
- Diş ipi her iki elinizin orta parmağına dolanarak ve baş parmağınızın yardımıyla kullanılır.
- Diş ipinizi dişlerinizin arasından yavaş hareketlerle ve kontrollü olarak geçirin.diş etini yaralayacak sert ve ani hareketlerden kaçının.

**MUAYENE ve RANDEVULARIZA LÜTFEN
TOK KARNINA GELİNİZ .**



HASTENİMİZDE VERİLEN HİZMETLER

- 1) Diş Hekimlerimizle Verilen Poliklinik Hizmetleri; Muayene , Diş Çekimi , Dolgu , Kanal , Diş Protez Hizmetleri.**
- 2) Ameliyathane Hizmetleri : Engelli Hastalarımızın Diş Tedavisi İçin Operasyonel Hizmetler .**
- 3) Evde Sağlık Hizmeti :**



MUAYENE GELİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1) Muayeneye gelirken lütfen tok karnına ve dişlerinizi fırçalayarak gelin.
- 2) Daimi kullandığınız ilaçlarınız varsa (Tansiyon, kalp, şeker vb) Diş hekiminize bilgi veriniz.
- 3) Kronik Hastalığınız varsa mutlaka size takip eden doktorunuza danışarak geliniz.
- 4) Hipertansiyon hastası iseniz hastanemize gelirken sabah saatlerini tercih ediniz.

HASTANEMİZ ÇALIŞMA SAATLERİ

LÜTFEN RANDEVU SAATLERİNE RİAYET EDİNİZ !!!

Randevunuzla ilgili kurum tarafından yapılması gereken değişiklikler için lütfen iletişim bilgilerinizi (özellikle telefon numaranızı) doğru veriniz!!!!!!

Poliklinik Saatleri :

Sabah : 08:00 — 12:00

Öğleden Sonra : 13:00 — 24:00

Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Çalışma

Saatleri :

**Sadece 24 saat “ Acil Hasta Muayenesi “ poli-
klinik hizmeti verilmektedir.**



T.C

KOCAELİ VALİLİĞİ

Sağlık İl Müdürlüğü

Nuh Çimento Sanayi Vakfı

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



HASTA BİLGİLENDİRME

BROŞÜRÜ

**Hastanemizde randevulu sistem ile hizmet
verilmektedir.**

Randevu Telefon: 182

**WEB sitemizden de randevu
alabilirsiniz.**

www.nuhcimentoadsm.saglik.gov.tr/

Adres :Emek Evler Mah Sapanca Yolu Cad No 3

Telefon : 0 262 371 51 70

FAX : 0 262 371 19 57

HASTA KAYIT İŞLEMLERİ



- 1) Muayene olmadan önce kioks cihazlarımızdan T.C kimlik numaranızı yazarak kendi kaydınızı yapabilirsiniz.
- 2) Hastanemizde randevulu hizmet verilmekte olup , ilk muayene ve çekim hariç diğer tedaviler için randevunu almanız gerekmektedir.
- 3) Hekiminiz ilk muayene sonrası tedavi gerektiren durumlarda tedavi planına göre randevunuz düzenlenecektir.Randevularınızda kurum tarafından yapılması gereken değişiklikler için size ulaşabilecek telefon numarası ve iletişim bilgilerinizin doğru verilmesi gerekmektedir.
- 4) Hastanemize T.C kimlik numarası ile başvuru zorunludur.

**Sağlıklı Dişler Mutlu Gülüşler
Dileriz**

HASTANEMİZDE KİMLERE HİZMET VERİLMEKTEDİR

- 1) Sosyal güvencesi olan çalışan veya emekli,
- 2) Özel Sağlık Sigortalı ,
- 3) Yeşil Kartlı ,
- 4) Resmi Kurum Mensupları ,
- 5) Silahlı Kuvvetler , Sivil ve Resmi Görevlileri ve Emeklileri,
- 6) Şehit Yakını Gazi , engelli vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir.
- 7) Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza Kamu Satış Tarifesi üzerinden hizmet verilmektedir.

Ayrıca ;

- 18 yaş altı Sosyal Güvencesi olmayan hastalardan ücret alınmamaktadır.
- 18 yaş üstü herhangi bir Sosyal Güvencesi olmayan hastalara muayene ücreti uygulanmaktadır.

**Sağlıklı Dişler Mutlu Gülüşler
Dileriz**

Sayın Hastalarımız ;

Kartepe İlçesi Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1996 yılında Nuh Çimento Vakfı tarafından Kocaeli Devlet Hastanesine bağlı trafik ve ilk yardım merkezi olarak yapılmış olup aynı yıl Sağlık Bakanlığına devredilmiştir.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremde Kocaeli Devlet Hastanesinin ortopedi servisinin hasar görmesiyle bu bina ortopedi servisi olarak hizmet vermiştir.

2002 mayıs ayında yapılan düzenleme ile ağız ve diş sağlığı merkezine dönüştürülerek 20 unit ile hizmet vermeye başlanmıştır.2010 yılında yapılan ek modül ve 2015 yılında yürüyüş yolunda yer alan Seka Semt polikliniğin hastanemize devrinin yapılmasıyla aktif çalışan 35 hekim ile ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmektedir.

Merkezimiz tüm sosyal güvenlik kurumları ile sivil hastalara hizmet sunmaktadır.

**Sağlıklı Dişler Mutlu Gülüşler
Dileriz**

HAMİLELİKTE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Ağız ve diş sağlığı hamilelik döneminde farklılık gösterir. Hamile olmayı düşünen her kadın, mutlaka bir diş hekimi kontrolünden geçmeli ve gereken tedavilerini yaptırmalıdır.



HAMİLELİK SIRASINDA DİŞ TEDAVİSİ YAPILABİLİR Mİ?

Gerekli olan tedaviler hamileliğin 2. üç ayında (4,5,6) ayda yapılmalıdır. En güvenli dönem bu dönemdir. Fakat anne çok fazla ağrı duyuyorsa veya dişte apse-iltihap gibi olaylar mevcut ise diş hekimi kar zarar olayına bakarak ve hamile annenin jinekoloğu ile görüşerek gerekli gördüğü acil diş tedavilerini yapabilir. Aksi takdirde mevcut enfeksiyona müdahale edilmeme sonucu bebeğe ve anneye daha çok zarar vermesi söz konusu olabilir.

HAMİLELİK SIRASINDA İLAÇ KULLANILABİLİR Mİ?

Hamilelik sırasında kullanılacak ilaçlar mutlaka hekim kontrolünde kullanılmalıdır. Diş tedavisi sırasında hekimin kullanacağı anestezi (uyuşturmak için kullanılan) anneye ve bebeğe herhangi bir zararı yoktur. Uyuşturulmadan yapılan müdahalelerde anne daha çok acı hissedecek ve strese yol açacak, bu da bebek için olumsuz olacaktır. Dantel müdahaleye gerek varsa mutlaka anestezi altında gerekir.



HAMİLELİKTE DİŞ RÖNTGENİNİN BİR ZARARI VAR MIDIR?



Diş hekimliğinde kullanılan röntgenin radyasyon miktarı düşük olmasına rağmen çok zorunlu kalmadıkça röntgen çekilmemelidir. Eğer röntgen çekilme aciliyeti varsa mutlaka kurşun yelek giyilmesi gerekir.

HAMİLELİKTE DİŞLERDEN KALSİYUM EMİLİR Mİ ?

HAMİLELİK DİŞLERİ ÇÜRÜTÜR MÜ?

Bebek kendisi için gerekli olan kalsiyumu annenin hamilelik boyunca aldığı gıdalardan karşılayacaktır. Eğer diyetindeki kalsiyumu yetersizse o zaman bebek annenin kemiklerinden kalsiyum sağlayacaktır. Fakat dişlerinden kalsiyum sağlayamaz. Halk arasında her bebek bir diş kaybettirir düşüncesi yaygındır. Fakat bunun hamilelikle hiç bir ilgisi yoktur.

HAMİLELİKTE AĞIZ VE DİŞ BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

Eğer anne ağız ve diş sağlığı bakımını iyi yapmazsa fırçalama yetersiz-düzensiz olursa diş eti problemi artacak, diş etleri büyüyecek ve hamilelik kisti dediğimiz oluşumlar meydana gelecektir.

www.nuhcimentoadsm.saglik.gov.tr/

Adres :Emek Evler Mah Sapanca Yolu Cad No 3

Telefon : 0 262 371 51 70

FAX : 0 262 371 19 57



T.C

KOCAELİ VALİLİĞİ

Sağlık İl Müdürlüğü

Nuh Çimento Sanayi Vakfı

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



ÇOCUK DİŞ SAĞLIĞI



Çocuklarda dişlenme 3 safhadan oluşmaktadır. Süt dişleri dönemi, Karışık dişlenme dönemi ve Kalıcı dişlenme dönemi. Süt dişleri bebek doğduğunda çene kemiğinin içinde gizlidir. Bebek yaklaşık 5-6 aylıkken ağızda dişler çıkmaya başlar. 3 yaşına kadar çocuğun ağızında 20 tane süt dişi bulunur. Süt dişleri sağlıklı ise çocuk iyi beslenip, çiğneyebilir. Çürüklü bir ağız çocuğun beslenmesine ve büyümesine olumsuz etki yapacaktır. Karışık dişlenme döneminde ağızda hem süt dişleri hemde kalıcı dişler vardır.

Çocuk ilk kalıcı dişini 6 yaşında hiç süt dişini düşürmeden çenenin en arkasından çıkarır. 12 yaşına kadar sırayla bütün süt dişlerini dökerek daimi dişlenmeye geçer.



Bu karışık dişlenme döneminde çocuklarda problemler fazla olacaktır. Mutlaka diş hekimi kontrollerine götürmek gerekir. Bu kontrollerde daimi dişlerdeki çapraşıklıklar ,dişlerdeki çürükler, gelişim bozuklukları tespit edilerek gerekli koruyucu tedavilere başlanır.

SÜT DİŞLERİ TEDAVİ EDİLİR Mİ?

EVET. Süt dişleri eğer tedavi edilmezse çürük ilerleyecek ve alttan gelecek olan kalıcı dişlere zarar verecektir. Aynı zamanda çürük olan süt dişleri tedavi edilmezse çocuk beslenme problemi çekecek yemek yiyemeyecek ve gelişimi de bozulacaktır. Kim ister ki çocuklarımızın ağrı duymasını. Bu yüzden mutlaka erken tedavi yapılması gereklidir.

SÜT DİŞLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Süt dişleri kalıcı dişlerin yerleri için yer tutucudur. Süt dişleri yüzün gelişimi ve şeklini etkiler.



EN ÖNEMLİ DİŞLER 6 YAŞ DİŞLERİDİR


6 yaşında çocuğun ilk daimi dişi sürer.6 yaş dişi çenenin en gerisinden çıkar .Çoğu anne-baba bu dişi süt dişi olarak görür ve nasıl olsa değişecek diyerek tedaviye yanaşmazlar. Oysa bu diş çürür ve çekilmek zorunda kalırsa yerine bir daha gelmeyecektir.

6 yaş dişleri çiğnemede çok önemli bir yer tutar. Bu yüzden ufak bir çürükte bile hemen diş hekimine başvurulmalıdır.



ÇOCUKLARINIZA NE ZAMAN DİŞ FIRÇALAMASI ÖĞRETİLMELİDİR?

Bebeklerde ilk diş 6-7 aylıkken çıkar. İşte bu aydan itibaren mutlaka dişleri de temizlenmeye başlanmalıdır. Anne bebeğin dişlerini bebek diş fırçası ile dairemsi hareketlerle temizlemeli,1 yaşına gelince mutlaka kendine verilip fırçalama yapması öğretilmelidir. Unutmamalıdır ki erken öğrenilen alışkanlıklar unutulmazlar.



ÇOCUKLAR TEDAVİ SIRASINDA AĞRI DUYARLAR MI?

Hayır ağrı duymazlar. Çünkü tıpkı büyükler gibi onların da tedavisi uyuşturularak yapılır. Fakat çocuklar seslerden korktukları için ağlar veya yaptırmak istemez ve korkarlar. Annenin ve babanın görevi çocukları tedaviden önce eğitmek ve psikolojik olarak hazırlamaktır.



Çocukların süt dişleri bazen düşmeyebilir. ve yandan daimi dişler gelirler. Dişlerin eğri gelmesi ve çapraşık olmaması için süt dişlerinin alınması gerekir. Annenin ve babanın karışık dişlenme dönemindeki çocukların ağızlarını mutlaka kontrol etmeleri gerekir.

Süt dişi tedavilerinden sonra çocukların dudaklarını ısırılmalarına dikkat etmek gerekir. Çünkü uyuşukluktan dolayı hissedemezler ve yaralanmalar olabilir.



DİŞ ÇEKİMİ SONRASI BİLİNMESİ VE UYULMASI GEREKEN ÖNERİLER!

Diş çekimi sonrası ,bölgeye yerleştirilen steril gazlı bez (tampon) ısırılarak 30 dakika süre ile ağızda tutulmalıdır. Hekiminiz önermediği takdirde kesinlikle tampon değiştirilmemelidir. Çekim bölgesine elle dokunmamalıdır, herhangi bir pamuk, peçete koyulmamalıdır. Çünkü sizin yara bölgesine uygulayacağınız şeyler steril olmayacak ve çekim yaranız mikroplanacaktır.

ÇEKİM SONRASI İLK 24 SAAT

Çekim sonrası 2 saat herhangi bir şey yenilmemelidir.2 saat sonrasında ise ılık ve yumuşak gıdalarla beslenilmelidir. Alkol ve sigaradan en az 3-4 saat uzak kalınmalıdır. Aksi takdirde yara iyileşmesi bozulacaktır.

ÇEKİM SONRASI KANAMA OLMASI

Çekimi takiben 12 saat süresince ağıza sızıntı şeklinde kan gelmesi normaldir. Kesinlikle tükürme yapılmamalı ve su ile gargara yapılmamalıdır.



ÇEKİM SONRASI AĞRI OLMASI

Çekim sonrası hafif ağrılar beklenen bir durumdur. Çekilen dişin durumunun ve pozisyonunun kötü olması, cerrahi işlem gerektirmesi, ağız hijyeninin kötü olması, bazı sistemik şeker, tansiyon) ağrı oluşmasına neden olabilir. Bu durumda aspirin dışında hekimin size önereceği bir ağrı kesici kullanabilirsiniz



Çekim sonrası yara iyileşme süresi bireylere göre değişmektedir. Ve bir kaç gün sürebilir. Eğer iyileşme süresi uzadıysa ve ağrılar şiddetli, kanama uzun süreli ve çoksa, şişlik ,yanakta morluk durumları söz konusu ise diş hekiminize başvurulması gerekir.

www.nuhcimentoadsm.saglik.gov.tr/

Adres :Emek Evler Mah Sapanca Yolu Cad No 3

Telefon : 0 262 371 51 70

FAX : 0 262 371 19 57



T.C

KOCAELİ VALİLİĞİ

Sağlık İl Müdürlüğü

Nuh Çimento Sanayi Vakfı


Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



DİŞ ETİ SAĞLIĞIMIZ

BAKTERİ PLAĞI Yapışkan ve diş yüzeylerinde biriken mikrop tabakasıdır. Eğer yeterli ve etkin fırçalanma yapılmazsa bakteri plağı ilerde çeşitli diş ve diş eti hastalıklarına sebep olur. Dişeti hastalıklarının belirtileri; fırçalama sırasında ya da yemek yerken oluşan kanama, diş taşı birikimi, dişetlerinde kızarıklık, şişlik , dişeti çekilmesi, dişlerde sallanma ve ağızda kötü kokudur. Dişeti hastalığının ilk aşaması **GİNGİVİTİS** diye adlandırdığımız henüz ilerlememiş dişeti iltihabıdır. Bu aşamada diş taşlarının ağızdan uzaklaştırılması gerekir. Müdahale edilmeyen dişeti hastalığı daha dan ilerleyerek dişin kök ve kemiğine zarar verecektir.





İlerlemiş diş eti hastalığına da **PERİODONTİTİS** denir. Bu safhada dişetleri çok hastadır, ve dişler sallanmaya başlamıştır. Dişi destekleyen kemik ve doku kayıplarına neden olur. Dişeti hastalıkları tedavi edilmezse vücutta çeşitli hastalıklara da neden olduğu uzmanlarca açıklanmıştır.

DIŞETİ HASTALIKLARIDA EN ÖNEMLİ ETKEN DIŞTAŞLARIDIR.

Diş taşları temizlenmeyen bakteri plaklarının üzerine tükürükte bulunan kalsiyum minerallerinin çökmesiyle oluşur. Mikroplardan oldukça zengin bir yapıya sahiptirler. Diş taşları fırçalamakla gitmez. Ancak diş doktorunun özel aletler kullanarak yapacağı müdahalelerle temizlenir.



Dişeti hastalığının ilerlediği durumlarda tedavi yöntemi daha zorlaşacak ,daha maliyetli ve daha komplike tedaviler gerekecektir.



Diş hekiminin dişeti hastalıklarına ve diş taşlarına (tartar) yönelik uygulayacağı tedaviden sonra ,yani diş taşı temizliğinden sonra, dişlerin ve dişetlerinin bir süre etkilenmesi, dişlerin sızlaması ve dişetlerinin kanaması normaldir. Yaklaşık bir hafta içinde bu belirtiler kendiliğinden geçecektir.

Diş taşları alınmazsa ağızda bakteriler artacak ve bakteriler dişlerin çürümelerine dişeti iltihabının büyümesine sebep olacak, ve ağızda kötü koku oluşacaktır.



DIŞ VE DIŞETİ SAĞLIĞIMIZI NASIL KORURUZ?

Dişler her yemekten sonra, günde en az 3 kez fırçalanmalıdır.

Bakterilere karşı korumak için ,floridly diş macunları kullanılmalıdır.

Diş fırçaları düzenli olarak 3 ayda bir değişmelidir.



Dişler fırçalandıktan sonra her gün bir defa diş ipi kullanılmalıdır.

Diş hekimi kontrollerini aksatmadan mutlaka yaptırılmalıdır.




DOLGU SONRASI PROBLEMLER NELERDİR?

Dolgu uygulanmış dişler bir müddet sonra sığağa ve soğuğa karşı duyarlıdır. Hatta bazı hastalarda çiğneme esnasında ağrılar duyulabilir. Nitekim dolgu yapılmış dişler yaralı dişlerdir ve iyileşmesi için zamana ihtiyaç vardır.

Bütün bu rahatsızlıklar 1-2 ay içerisinde geçecektir. Bazen dokular kendini iyileştiremez.

Aşırı çürük durumlarında ,ağız bakımının kötü olması gibi durumlarda doku iyileşmekte zorlanır. Ve ağrılar hastayı çok rahatsız etmeye başlar. Bu durumda diş hekiminin müdahalelerine ihtiyaç vardır.



Diş Doktoru gereken tedaviyi yapacak ve ağrıyı durduracaktır.



DIŞ VE DIŞETİ SAĞLIĞIMIZI NASIL KORURUZ?

Dişler her yemekten sonra, günde en az 3 kez fırçalanmalıdır.

Fırçalamadan hemen sonra bakterilere karşı korumak için ,floride diş macunları kullanılmalıdır.

Diş fırçaları düzenli olarak 3 ayda bir değişmelidir.

Dişler fırçalandıktan sonra ağız ve diş bakım sularının kullanılması ,hem fırçalamanın etkisini artırır, hem de bakteri önlemeye yardımcı olur.

Dişler fırçalandıktan sonra her gün bir defa diş ipi kullanılmalıdır.

Diş hekimi kontrollerini aksatmadan mutlaka yaptırılmalıdır.



www.nuhcimentoadsm.saglik.gov.tr/

Adres :Emek Evler Mah Sapanca Yolu Cad No 3

Telefon : 0 262 371 51 70

FAX : 0 262 371 19 57



T.C

KOCAELİ VALİLİĞİ

Sağlık İl Müdürlüğü

Nuh Çimento Sanayi Vakfı

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi





KANAL TEDAVİSİ NEDİR ?

VE NASIL , OLUR?

Dişlerin bakımsızlığı sonucu ile oluşan çürükler temizlenip dolgu yapılmazlarsa ve ihmal edilirse çürük derinlerine ilerleyerek dişin kanalına ulaşır ve enfeksiyona sebep olur. Bu enfeksiyon diş de zonklayan korkunç ağrılara neden olur. Diş hekimleri enfekte olmuş bu hastalıklı dişlerin çürüklerini temizler ve kanal tedavisi yaparlar.

Kanal tedavisi dişin içinde bulunan iltihaplı dokuların temizlenmesi ve kök kanallarının içine ilaç koyularak yapılan bir tedavi şeklidir





Kanal tedavisi sırasında veya sonrasında beklenmeyen ağrılar olabilir. Bu gibi durumlarda diş doktorunun haberinin olması tedavinin gidişatı açısından daha iyidir.

Kanal tedavisi gören diş hasta bir dişdir. İyileşmesi için zamana ihtiyacı vardır.

Kanal tedavisi yapılmış dişler zayıflar ve kırılabilir. Bu yüzden hastalar dikkatli olmalı sert yiyeceklerden kaçınmalı , çiğneme sırasında çok zorlanmamaları gereklidir. Dişin kırılması veya zayıf kalması durumlarında daha dayanıklı hale getirebilmek için kron kaplama yapma gereği duyulabilir..




Kanal tedavisi yapılan dişlerde özellikle ön dişlerde iç kanamalar sebebiyle morarma gibi renk değişikliği olabilir.



Kanal tedavisi tek köklü dişlere çoğu zaman tek seansta yapılabilir. Fakat arka dişlerin kanal tedavisi çok daha zordur. Çünkü arka dişler çok köklü ve çok kanallıdır. Çok daha fazla zaman ve özen gerektirir.

Kanal tedavisi ne kadar başarılı yapılırsa yapılısın kök ucunda enfeksiyon gelişebilir. Bunun tedavisi eğer uygunsa kök ucunun ve kistin alınmasıdır. Veya dişin çekilmesidir.



Kanal tedavisi etkin ve güvenli bir tedavidir. Bunun yanında bilinmesi gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

- 1) Kanal tedavisi diş çekiminden önceki son seçenektir. Yüksek başarı oranına rağmen , her vakanın başarılı olacağı garanti edilmez .
- 2) Tedavi sırasında ve sonrasında dişler çekime gidebilir.
- 3) Tedavi sırasında kullanılan hassas aletler dişin içinde kırılabilir.
- 4) İşlemlerden sonar bazen ağrı oluşabilir , bu durum bir kaç gün sürebilir.
- 5) Gerekli görülürse hekim hastaya ağrı kesici antibiyotik gibi ilaçlar reçete edebilir.

- 6) Tedavinin belli aşamalarında röntgen çekilebilir. Hamile olan hastaların bu konuda hekim bilgi vermelerinden kaymaklanan sorumluluk hastaya aittir.
- 6) Tedavi yapılacak diş üzerindeki restorasyon (kron köprü , dolgu v.b) gerektiğinde sökülebilir, bundan sonra restorasyonların yenilenmesi gerekebilir.



www.nuhcimentoadsm.saglik.gov.tr/

Hasta protezi ilk defa kullanmaya başladığında protez hastaya yabancı ve büyükmüş hissi verecektir. Protezler ağızda durmak istemeyecek ve yerinden çıkacaktır. Hastanın konuşması bozulacak yemek yemede güçlük çekecektir. Hasta yutkunma zorluklarıyla karşılaşacak hatta bulantı oluşacaktır. Ağızda vuruklar oluşacak ve ağız yaraları çıkabilecektir. Fakat bütün bu sorunlar yaklaşık bir ay gibi kısa bir zaman zarfında azalarak geçecek ve hasta protezine alışacaktır. Sürekli kullanılmayan protezlere kolay alışılmaz ve harcanan emekler de boşa gider. Protez kullanmak sabır ister. Eğer hastalar inatla protezi kullanırlarsa çok daha çabuk alışacaktır. Hastalar protezlerini gece çıkartmalı ve sabah tekrar takmalıdırlar.



www.nuhcimentoadsm.saglik.gov.tr/

PROTEZLER NASIL TEMİZLENMELİDİR

Protezler her yemekten sonra çıkartılıp fırçayla içi ve dışı temizlenmelidir. Protezlerin kendi kendilerini temizleme özellikleri yoktur. Hastaların temizlemesi gerekir.

malzemeleri ile;



Protezler asla temizlik malzemeleri ile (çamaşır suyu, vim gibi) asla temizlenmemelidir.

Aksi takdirde protezler bozulacak ve hastaların sağlığı da olumsuz etkilenecektir.

Bir protezin ömrü 4-6 yıldır.

Çünkü yaş ilerledikçe insan vücudunda olan değişiklikler çene kemiğinde de olacağından protezlerde ağıza uyumsuz gelecek tutuculuğunu yitirecektir



T.C

KOCAELİ VALİLİĞİ

Sağlık İl Müdürlüğü

Nuh Çimento Sanayi Vakfı

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



KRON — KÖPRÜ / PARSİYEL — TOTAL PROTEZLER

KRON-KÖPRÜLER: Ağızdaki diş eksikliklerinin giderilmesi amacıyla boşluğun yanındaki dişlerin küçültülüp köprü ayağı olarak kullanılmasıyla yapılan sabit protezlerdir. Köprü yapılabilmesi için boşluğun yanındaki dişlerin sağlıklı ve çiğneme kuvvetini kaldırabilecek güçte olması gerekir. Buna doktor karar verir. Köprüler eksik diş sayısına bağlı olarak bir, iki, yada daha fazla diş küçültülerek yapılır. Boşluğun yanındaki dişler küçültülürken bazen dişlerin sinir ve damarlarına çok yaklaşabilir. Bu gibi durumlarda dişler ölürler ve hasta ağrı duymaya başlar. Bu dişlere kanal tedavisi yapılması gerekir. Dişi çekmek çözüm değildir.

İlk takılan köprü ve kronlara alışmak zaman alacaktır. Unutulmamalıdır ki kron-köprüler ağız için yabancı maddedir.

Köprülerin dil tarafında bir miktar boşluklar vardır. Bu boşlukların olmasının sebebi özel diş ipleri ile köprünün altını temizleyebilmektir. Temizlenemeyen köprüler koku yapacaktır.



Eğer fırçalamaya ve diş ağız bakımına yeterli önem gösterilmezse köprünün altındaki dişler ve dişetleri sağlığını kaybedecektir. Köprüler sık sık düşecek hatta köprü altındaki dişler sallanmaya başlayacak ve bu dişlerin çekilmesine neden olacak hasta dişlerini kaybedecek ve artık kullanması daha zor olan takmalı çıkartmalı protez kullanmak zorunda kalacaktır.



HAREKETLİ PROTEZLER

Dengeli beslenebilmek için dişlere ve iyi çiğnemeye ihtiyaç vardır. Bunun için dişlerini kaybetmiş hastalara protez yapılır.



Protezlerin sadece çiğneme yapmak için değil, daha güzel ve anlaşılabilir konuşmasını sağlamak için hastanın estetiğini ve psikolojisini düzeltmek için yapılır. Hareketli protezler iki tiptir. Yarım damaklı ve tam damak protezler.

YARIM DAMAK PROTEZLER (PARSİYELPROTEZLER)

Hastanın az da olsa kendi dişleri vardır. Bu doğal dişlerden kuvvet alarak hareketli yarım damak protezler yapılır. Bu protezler tam protezlere göre daha kullanışlı, stabil ve daha tutucudur. Çünkü var olan dişlere tutunarak ağızda kalırlar



TAM DAMAK PROTEZLER (TOTAL PROTEZLER)



Hiç bir yere tutunmadan, hastanın ağız kasları, dili, dudakları ve tükürüğünün yapıştırıcı etkisi ile ağızda kalırlar. Bu protezleri kullanmak oldukça beceri isteyen ,zor bir iştir. Diş hekimi hastaya ne tür bir protez yapacağını planlamasını yaparak gerekli ölçüleri alır. Hastaya çeşitli provalar yapmak için randevulara çağırır.



Bu provaların amacı protezin hastaya uyumlu olup olamayacağını kontrol etmektir. Bütün bu zor ve zahmetli uğraşlardan sonra protez hastaya teslim edilir.

